



PLUVIGEAL LECITUM

FICHA TÉCNICA Technical Data Sheet

Sustancia básica. *Lectina de soja.*

Concentrado emulsionable (EC)

(Reglamento de Ejecución (UE) N.º 2015/1116, SANCO/12798/2014)

COMPOSICIÓN

Lectina de soja.....20 % p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto.....líquido

Color.....beige

pH.....5,8 ± 1,0

Densidad.....1,00 ± 0,05 g/cm³

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PLUVIGEAL LECITUM tiene efecto en el control fúngico, es 100% natural obtenido a partir de lecitina de soja. Además, previene la instalación de patógenos en la superficie vegetal debido a su capacidad para eliminar el exceso de humedad.

La fórmula es exclusiva de VEGANIC NATURE.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Los usos que se presentan a continuación están de acuerdo con el reglamento de ejecución (UE) n.º 2015/1116 por el que se aprueba la sustancia básica lecitina de soja para su uso en pulverización foliar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Envasado: Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), garrafa de 5 (cajas 4 x 5L) y garrafas 20L, bidones de 200 L y contenedores de 1000 L.

USO PROFESIONAL

Las especificaciones técnicas del producto, como contenidos garantizados, propiedades, dosis y modo de uso, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante, se detallan en la etiqueta.

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según Reglamento (889/2008) conforme a la Norma UNE 315500.





FICHA TÉCNICA Technical Data Sheet

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Aplicación
Frutales: manzano y melocotonero	Oídio: <i>Podosphaera leucotricha</i> Lepra o Abolladura: <i>Taphrina deformans</i>	375 mL/hL	pulverización foliar 3 a 12 aplicaciones espaciadas cada 5 días. Desarrollo del fruto.
Grosella Ribes uva-crispa	Oídio: <i>Microsphaera grossulariae</i>	1L/hL	pulverización foliar 2 a 4 aplicaciones espaciadas cada 5 días. Desarrollo vegetativo a maduración de fruto
Hortalizas como pepino <i>Cucumis sativus</i>	Oídio: <i>Podosphaera xanthii</i>	750 mL/hL	pulverización foliar 2 a 6 aplicaciones espaciadas cada 5 días. Primeras hojas a maduración completa
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	750 mL/hL	pulverización foliar 2 aplicaciones espaciadas 7 días. Primeras hojas a maduración completa
Canónigos <i>Valerianella locusta</i>	<i>Erysiphe polyphaga</i>	750 mL/hL	pulverización foliar 1 aplicación Primeras hojas a maduración completa
Tomate <i>Lycopersicum esculentum</i>	Tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i>	750 mL/hL	pulverización foliar 2 a 6 aplicaciones espaciadas cada 7 días. Primeras hojas a maduración completa
Endivia: <i>Cichorium endivia L.</i>	Hongos: <i>Alternaria cichorii</i>	750 mL/hL	pulverización foliar 2 a 6 aplicaciones espaciadas cada 7 días. Primeras hojas a maduración completa
Ornamentales especialmente rosas	Oídio y otras enfermedades por hongos	375 mL/hL	pulverización foliar 3 a 12 aplicaciones espaciadas cada 5 días. Primeras hojas a maduración completa
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Mildiu: <i>Plasmopara viticola</i> <i>Erysiphe necator</i>	375 mL/hL	pulverización foliar 3 a 12 aplicaciones espaciadas cada 5 días. Primeras hojas a maduración avanzada

Actualización: 28/05/24

