



# Funcitive

**Sustancia básica. Lecitina de soja.  
Concentrado emulsionable (EC)**

## Descripción

Funcitive es una sustancia básica formulada a partir de lecitinas específicamente seleccionadas con alto contenido en fosfoglicéridos naturales.

Es un producto con efecto fungicida, que mitiga los efectos de la necrosis celular del limbo foliar causada por la diseminación de las hifas de los hongos en las células vegetales. Tiene un efecto preventivo y curativo sobre los cultivos.

Funcitive representa la solución natural y eficaz para proteger los cultivos de enfermedades fúngicas sin comprometer la calidad ni la seguridad de la producción.

## Beneficios

- ▶ Efecto fungicida natural con grandes resultados
- ▶ Fortalece las estructuras celulares y mejora la tolerancia al estrés abiótico
- ▶ Fácil aplicación
- ▶ Compatible con otros productos
- ▶ Es apto para todo tipo de cultivos
- ▶ No produce residuos
- ▶ Certificado bajo la normativa de agricultura ecológica

## Especificaciones técnicas

- ▶ 100 % Lecitinas
- ▶ pH: 6

**Teléfono: +34 913 273 200**  
**info.spain@rovensanext.com**

Parque empresarial Cristalia  
Edificio ONIC 5, 6ª planta  
Vía de los poblados, 3  
28033 Madrid (España)



**Rovensa  
Next**

### Sustancia básica. Lecitina de soja. Concentrado emulsionable (EC)



## Dosis de aplicación

**\*Para un mejor manejo del producto se recomienda contactar con el equipo técnico-comercial de Rovensa Next.**

| CULTIVO                                  | TARGET                                                                                             | DOSIS (mL/hL) | Nº APLICACIONES                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Árboles frutales (Manzano, Melocotonero) | Oídio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), Lepra del melocotonero ( <i>Taphrina deformans</i> )     | 75            | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH03 hasta BBCH79 |
| Grosella                                 | Oídio ( <i>Microsphaera grossulariae</i> )                                                         | 200           | Entre 2 y 4 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH85  |
| Hortícolas como pepino                   | Oídio ( <i>Podosphaera xanthii</i> )                                                               | 150           | Entre 2 y 6 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89  |
| Lechuga                                  | Oídio ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                                                            | 150           | 2 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89            |
| Canónigos                                | Oídio ( <i>Erysiphe polyphaga</i> )                                                                | 150           | 1 aplicación entre BBCH10 y BBCH89                  |
| Tomate                                   | Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                     | 150           | Entre 2 y 6 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89  |
| Endivia                                  | Alternaria ( <i>Alternaria cichorii</i> )                                                          | 150           | Entre 2 y 6 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89  |
| Ornamentales, especialmente rosas        | Oídio y otras enfermedades fúngicas                                                                | 75            | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Viñas                                    | Oídio ( <i>Plasmopara viticola</i> , <i>Erysiphe necator</i> )                                     | 75            | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH11 hasta BBCH85 |
| Fresa, Frambuesa                         | Oídio y otras enfermedades fúngicas ( <i>Podosphaera aphanis</i> , <i>Phytophthora fragariae</i> ) | 200           | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH89 |
| Patata                                   | Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                     | 200           | Entre 3 y 12 aplicaciones desde BBCH10 hasta BBCH90 |
| Zanahoria                                | Oídio ( <i>Leveillula taurica</i> )                                                                | 200           | 4 aplicaciones desde BBCH19 hasta BBCH90            |

\* La lecitina de soja no se vende como un producto fitosanitario, pero es útil para la protección de los cultivos.

Los usos que se presentan a continuación están de acuerdo con el Reglamento de ejecución (UE) nº2015/1116, por el que se aprueba la sustancia básica Lecitina de soja.

\* No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina o ácida.

## Formato

► 1L, 5L, 10L, 20L, 200L, 1000L

