

Harvinta®

Fungicida

Harvinta®

Fungicida de la familia de las Benzofenonas (Grupo FRAC: 50) sistémico con actividad preventiva y curativa, con uso autorizado para el control de oídio. Posee un potente efecto vapor que proporciona una mejorada protección.

Harvinta® tiene un limitado transporte acrópeto que le asegura un reparto adecuado para una correcta protección contra el patógeno. Interviene en los procesos de diferenciación celular del hongo inhibiendo el crecimiento del micelio, su penetración en hojas y frutos, la formación de haustorios y la esporulación. El producto es absorbido a través de la cutícula de la hoja, presentando acumulación en los tejidos de las zonas tratadas de la planta.

Compártelo:



CARACTERÍSTICAS

N° DE REGISTRO: 24.143

PRESENTACIÓN: 1 L

COMPOSICIÓN: Metrafenona 50% p/v

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada (SC)

CLASIFICACIÓN:

UDS./EMBALAJE:

USOS AUTORIZADOS

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
BERENJENA, PIMIENTO, TOMATE	Oídio del tomate	0,03%	3
CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE, CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE	Oídio de las cucurbitáceas y Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,02%	3

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
LÚPULO	Oídio del lúpulo	0,01 - 0,02% (máx. 0,2 L/ha)	28
VIÑA	Oidio de la vid	0,01 - 0,02% (máx. 0,2 L/ha)	28

Recomendaciones de uso

Aplicar en pulverización normal, mediante tractor o manualmente al aire libre y con lanza o pistola en invernadero, procurando un buen recubrimiento foliar del cultivo.

Para lúpulo aplicar durante el BBCH 11-81. Los tratamientos se deberán realizar desde la prefloración hasta el inicio de la madurez. El primer tratamiento se realizará cuando las condiciones medioambientales indiquen que existe riesgo de aparición de la enfermedad o cuando las Estaciones de Avisos así lo indiquen.

Berenjena, Pimiento (Invernadero), Cucurbitáceas de piel no comestible y Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre): realizar 2 aplicaciones a intervalos de 14 días, con un volumen de caldo de 200-1.000 L/Ha.

Tomate y Cucurbitáceas de piel comestible (invernadero): realizar 2 aplicaciones a intervalos de 14 días, con un volumen de caldo de 200-1.500 L/Ha.

Vid: realizar 3 aplicaciones a intervalos de 14 días.

Lúpulo: realizar 2 aplicaciones a intervalos de 14 días, con un volumen de caldo de 1.000 L/Ha.

Productos relacionados

Airone®
Fungicida

Airone® SC Blue
Fungicida

Alial®
Fungicida

Alial® 80WG
Fungicida

Alial® Doble
Fungicida

Azaka® 25 SC
Fungicida