

Juncal®
Herbicida

Juncal®

Juncal® es un herbicida de traslocación, principalmente absorbido por las hojas, selectivo para el control en post-emergencia de malas hierbas de hoja ancha (dicotiledóneas).

Compártelo:



CARACTERÍSTICAS

N° DE
REGISTRO: 25.400

PRESENTACIÓN: 5 L

COMPOSICIÓN: Fluroxipir 20% p/v

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable (EC)

CLASIFICACIÓN:

UDS./EMBALAJE: 4x5 L

USOS AUTORIZADOS

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
CÍTRICOS	Dicotiledonias	1,5 L/ha	15
MAÍZ, MAÍZ FORRAJERO	Dicotiledonias	1 L/ha	NP
OLIVO	Dicotiledonias	1,5 L/ha	NP
PRADERAS DE GRAMÍNEAS	Dicotiledonias	1,5-2 L/ha	14
AVENA, CEBADA, CENTENO, TRIGO, TRITICALE	Dicotiledonias	0,75-1 L/ha	NP

Recomendaciones de uso

Cereales y Maíz: 150-400 l/ha de agua, para dar una buena cobertura de la mala hierba; incrementar el volumen de pulverización a 300-400 l/ha de agua cuando haya rebrotes de patata. Utilizar un volumen de pulverización más elevado, en aplicaciones de cultivos densos y cuando las malas hierbas sean grandes o hayan endurecido.

Praderas de gramíneas: 200-400 l/ha de agua, utilizando un mínimo de 300 l/ha en pradera establecida, para dar una buena cobertura de la mala hierba; Utilizar un volumen de pulverización más elevado, en aplicaciones de cultivos densos y cuando las malas hierbas sean grandes.

Olivo y cítricos: 200-400 l/ha, en aplicación dirigida al suelo, sin mojar los árboles.

Aplicar en pulverización normal con tractor para todos los usos o manual con lanza/pistola y mochila en olivo, cítricos y gramíneas (prados de siembra).

No hacer rotación de cultivos o escarificar hasta que no hayan pasado 7 días desde el tratamiento.

No utilizar el producto en cultivos asociados con tréboles u otras leguminosas, podría ser usado en cultivos asociados a praderas de gramíneas sólo si se éstas están firmemente establecidas, no utilizar en cultivos destinados a obtención de simiente.

No aplicar antes del 1 de marzo del año de la cosecha. Cuando el producto es utilizado en tratamientos localizados en praderas permanentes, rotacionales o nuevas siembras de praderas de gramíneas, la concentración máxima no debe exceder de 300 ml/100 l de agua.

No efectuar tratamientos en días de viento y tomar precauciones para evitar daños en cultivos colindantes, así como evitar solapes en la pulverización.

En olivo y cítricos, no aplicar en plantaciones de menos de 4 años.

No mojar los árboles, en especial los brotes jóvenes.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Productos relacionados

Omnera® LQM®

Herbicida

Inka® 70

Herbicida

Targa®

Herbicida

Accelerator®

Progress

Herbicida

Acierto® SC

Herbicida

Alcance® Sync Tec

Herbicida