

Qentivia

Fungicida

Qentivia

Fungicida preventivo con una excelente actividad contra Botritis, actúa mediante la inhibición del crecimiento del tubo germinativo del hongo en la superficie de la planta, y en los primeros estadios de colonización de la hoja.
Grupo FRAC 17.

Compártelo:



CARACTERÍSTICAS

N° DE REGISTRO: ES-00324

PRESENTACIÓN: 1 Kg

COMPOSICIÓN: Fenhexamida 50% p/p

FORMULACIÓN: Granulado dispersable en agua (WG)

CLASIFICACIÓN:

UDS./EMBALAJE:

USOS AUTORIZADOS

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
BERENJENA, CALABACÍN	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,15%	1
CEREZO	Monilia (Monilinia fructigena)	0,1-0,15%	1
CIRUELO	Monilia (Monilia spp)	0,1-0,15%	1
FRAMBUESA	Botrytis cinerea y Botrytis spp	0,15%	1

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
FRESA	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,15%	1
JUDÍA VERDE	Botrytis spp	0,15%	1
LECHUGA Y SIMILARES	Podredumbre de la lechuga (Sclerotinia minor) y Botrytis spp	0,15%	3
ALBARICOQUERO, MELOCOTONERO	Monilia (Monilia spp)	0,1-0,15%	1
ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES, CONÍFERAS, FRONDOSAS, ORNAMENTALES HERBÁCEAS, PALMÁCEAS, PALMERA DATILERA	Botrytis spp	0,15%	NP
PEPINO, PIMIENTO, TOMATE	Botrytis spp	0,15%	1
UVA DE MESA	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,1-0,15%	7

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
VID DE VINIFICACIÓN	Podredumbre		
	gris (Botrytis cinerea)	0,1-0,15%	14
ARÁNDANO, ZARZAMORA	Botrytis spp	0,15%	1

Recomendaciones de uso

Albaricoquero y melocotonero: Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 500-1.000 L/ha. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por estación: 2x BBCH 61-69 + 2x BBCH 81-89.

Arándano, mirtilo y zarzamoras (invernadero): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha. BBCH 55-89.

Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales herbáceas, palmáceas y palmera datilera (aire libre): Realizar 1-4 aplicaciones en intervalos de 7-14 días, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha y un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha.

Arbustos y Pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales herbáceas, palmáceas y palmera datilera (invernadero): Realizar 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.

Berenjena (aire libre): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 10-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 55-89.

Berenjena (invernadero): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 7 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.

Calabacín (aire libre): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 8-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 55-89.

Calabacín (invernadero): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 10 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.

Cerezo: Realizar 1-4 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 500-1.000 L/ha. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por estación: 2x BBCH 61-69 + 2x BBCH 81-89.

Ciruelo: Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por estación: 2x BBCH 61-69 + 2x BBCH 81-89.

Frambueso y Fresal (aire libre): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha. BBCH 55-89.

Frambueso (invernadero): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha.

Fresal (invernadero): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha.

Judía Verde (aire libre): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha. BBCH 55-79.

Judía Verde (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 8 días con un volumen de caldo de 200-1.000 L/ha.

Lechuga y similares (aire libre): Realizar de 1-2 aplicaciones en intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha. BBCH 13-49.

Pepino (aire libre): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 10-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 61-89.

Pepino (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 8 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha, BBCH 55-89.

Pimiento (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 8 días, con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha y con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha, BBCH 55-89.

Tomate (aire libre): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 55-89.

Tomate (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 7 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.

Vid de mesa y vid de vinificación: Realizar 1 única aplicación a dosis máx. de 1,5 kg/ha o 2 aplicaciones con intervalo de 10-14 días a dosis máx. de 1 kg/ha, con un volumen de caldo de 1.000 L/ha. BBCH 71-85.

Productos relacionados

Airone®

Fungicida

Airone® SC Blue

Fungicida

Alial®

Fungicida

Alial® 80WG

Fungicida

Alial® Doble

Fungicida

Azaka® 25 SC

Fungicida